

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Анима-А

Торговое наименование: Анима-А

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Декспантенол+Хлоргексидин

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав

1 г крема содержит:

действующие вещества: декспантенол – 50,0 мг, хлоргексидина гидрохлорид – 5,0 мг;

вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол – 0,2 мг, метилпарагидроксибензоат – 1,5 мг, пропилпарагидроксибензоат – 1,0 мг, полисорбат 80 – 1,0 мг, цетиловый спирт – 36,0 мг, ланолин безводный – 25,0 мг, стеариловый спирт – 24,0 мг, стеариновая кислота – 12,0 мг, парафин жидкий – 100,0 мг, цетомакрогол 1000 – 22,0 мг, парафин мягкий белый – 100,0 мг, вода очищенная q.s. – до 1,0 г.

Описание: Белый или почти белый однородный крем с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; бигуаниды и амидины.

Код АТХ: D08AC52

Фармакологические свойства

Крем содержит хлоргексидин – антисептик, который активен против бактерий, имеющих обычно на коже или попавших на кожу в результате загрязнения раны. Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов. Препарат успокаивает боль благодаря охлаждающему действию. При нанесении на поверхность раны защищает от инфекции, способствуя заживлению. Он легко наносится и смывается. Крем нежирный и не липнет.

Показания к применению

Обработка и лечение небольших ран с угрозой инфицирования, таких как ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги; инфицированных поверхностных поражений кожи; трещин сосков в период грудного вскармливания.

При хронических ранах, например, трофических язвах голени, пролежнях, а также при

операционных ранах.

Противопоказания

Препарат Анима-А не следует применять при повышенной чувствительности к декспантенолу, хлоргексидину или любому из вспомогательных веществ; не следует наносить на поврежденную барабанную перепонку; в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат Анима-А можно использовать во время беременности и в период грудного вскармливания. Однако следует избегать его применения на больших поверхностях кожи. Если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат Анима-А наносят тонким слоем один или несколько раз в день на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

Побочное действие

Аллергические кожные реакции, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и волдыри. Гиперчувствительность, анафилактическая реакция и анафилактический шок (потенциально опасный для жизни), проявляющиеся астматическим синдромом, легкими или умеренными реакциями с возможным вовлечением кожи, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, включая такие симптомы, как сыпь, крапивница, отек, зуд и сердечно-дыхательные расстройства.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Декспантенол даже в высоких дозах хорошо переносится и не токсичен. Случаи гипервитаминоза неизвестны.

При отравлении хлоргексидином описаны случаи возрастания уровня аминотрансферазы.

При случайном попадании внутрь практически не абсорбируется. При необходимости

проводится симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация) не следует применять одновременно с другими антисептиками. Хлоргексидин несовместим с мылом и другими анионными соединениями.

Особые указания

Следует избегать попадания в глаза, уши и на слизистые оболочки. Нельзя принимать внутрь (при приеме по ошибке больших количеств внутрь следует сразу обратиться к врачу). Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также кусанные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (опасность столбняка). Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими, или рана не заживает в течение 10–14 дней, то в этом случае следует обратиться к врачу. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает и появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой (опасность сепсиса). Препарат Анима-А не следует использовать для лечения кожных раздражений, не склонных к инфицированию (например, солнечные ожоги).

Частое нанесение на один и тот же участок кожи может привести к появлению раздражения. Препарат предназначен для обработки и лечения небольших ран, следует избегать нанесения в больших количествах.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 5 % + 0,5 %.

По 10 г, 30 г, 60 г или 100 г препарата в алюминиевой тубе с бушоном и внутренним лаковым покрытием.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АДЖИО ФАРМАЦЕВТИКАЛЗ ЛТД., Индия

Адрес производства: Т-81, 82, Корпорация промышленного развития штата Махараштра, БХОСАРИ, ПУНА - 411026, Талука: бхосари, Округ: Пуна - Зона 3.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Аргументум»

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, этаж 1, помещение VI, комната 39, офис 62

Тел.: +7 (499) 110-09-12

Электронная почта: info@argumentum-ag.ru

Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация

ООО «Аргументум»

Фактический адрес: 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, владение 12, строение 1, этаж 3, офис 6-7

Тел.: +7 (499) 110-09-12

Электронная почта: safety@argumentum-ag.ru